

Przychodnia "Przy Belmie"

Imię i nazwisko pacjenta:.....

Data badania:.....

Godzina badania:.....

Przygotowanie do badania jelita grubego przy zastosowaniu preparatu Fleet® Phospho-soda

48

godzin
przed
badaniem

dieta ryż, makaron, bulion, chleb,
ubogo- gotowane lub smażone mięso i
resztkowa ryby, przecedzone soki, herbata,
kawa, niegazowane napoje

nie należy
spożywać

sałatek, warzyw, owoców, mięsa i ryb z sosami,
kiełbasy, mleka, tłuszczów i gazowanych napojów

24

godziny
przed
badaniem

dieta woda, przecedzony bulion,
płynna przecedzone soki, herbata, kawa,
niegazowane napoje orzeźwiające

Instrukcja przyjmowania preparatu Fleet® Phospho-soda

BADANIE PRZED POŁUDNIEM

PIERWSZA DAWKA

W DNIU POPRZEDZAJĄCYM BADANIE/ZABIEG

O godzinie 7.00 rozpuścić zawartość jednej buteleczki Fleet® Phospho-soda w ½ szklanki zimnej wody lub soku i wypić powoli. Popić co najmniej 1 szklanką zimnej wody.

DRUGA DAWKA

W DNIU POPRZEDZAJĄCYM BADANIE/ZABIEG

O godzinie 19.00 należy wypić następną dawkę Fleet® Phospho-soda (zawartość jednej buteleczki) rozpuszczoną w ½ szklanki zimnej wody lub soku. Popić co najmniej 1 szklanką zimnej wody.

BADANIE PO POŁUDNIU

PIERWSZA DAWKA

W DNIU POPRZEDZAJĄCYM BADANIE/ZABIEG

O godzinie 19.00 rozpuścić zawartość jednej buteleczki Fleet® Phospho-soda w ½ szklanki zimnej wody lub soku i wypić powoli. Popić co najmniej 1 szklanką zimnej wody.

DRUGA DAWKA

W DNIU BADANIA/ ZABIEGU

O godzinie 7.00 należy wypić następną dawkę Fleet® Phospho-soda (zawartość jednej buteleczki) rozpuszczoną w ½ szklanki zimnej wody lub soku. Popić co najmniej 1 szklanką zimnej wody